

کم کاری مادرزادی تیروئید (هیپوتیروئیدیسم)

یک بیماری ارثی و مادرزادی است و مهم ترین علت عقب ماندگی ذهنی در نوزادان است .

وضعیت بدنی نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید ممکن است هنگام تولد عادی یا بدون علامت باشد . یعنی نوزاد با ظاهری سالم باشد .

برخی یا تمام علائم زیر در نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید ممکن است بروز کند :

۱- کاهش دمای بدن ، عدم تمایل به شیر خوردن و بزرگی زبان

۲- کبودی دست و پا ، خشکی پوست و زردی بیش از دو هفته

۳- به طور کلی با وجود ظاهر سالم یا نبود علائم بیماری ، همچنان احتمال کم کاری مادرزادی تیروئید وجود دارد .

هرچه ابتلا به کم کاری تیروئید دیرتر تشخیص داده شود ، ممکن است علاوه بر عقب ماندگی ذهنی و علائم ذکر شده ، عوارضی نظیر کوتاهی قد ، لالی و کاهش شنوایی نیز بروز کند .

علت اصلی بروز این بیماری ناشناخته است ، اما کمبود ید و ازدواجهای فAMILI از عوامل موثر هستند .

چگونه این بیماری را در نوزادان شناسایی کنیم ؟

❖ با آزمایش ساده غربالگری خون در نوزاد ۳ تا ۵ روزه می توان بیماری کم کاری تیروئید را شناسایی کرد .

❖ ۳ قطره خون از پاشنه پای نوزاد ۳ تا ۵ روزه در مراکز بهداشتی درمانی گرفته می شود .

❖ آزمایشهای مربوط به این بیماری روی خون نوزاد انجام می شود .

❖ در صورت مثبت شدن آزمایش اولیه ، مشکوک بودن نوزاد از نظر ابتلا به این بیماری مطرح می شود .

❖ به والدین یا سرپرست نوزاد اطلاع داده می شود تا برای تشخیص قطعی اقدام نمایند .



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

بیمارستان پورسینا شهرستان مانه و سملقان

غربالگری تیروئید



واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی

با آرزوی سلامتی

آدرس وب سایت بیمارستان:

nkums.ac.ir/category/15413

والدین آگاه، نوزاد سالم و باهوش



توجه:

چنانچه ابتلای نوزاد به کم کاری تیروئید تایید شود، برای درمان به پزشک یا بیمارستان منتخب ارجاع می شود و زیر نظر متخصص راهنمایی ها و خدمات لازم انجام و درمان های مورد نیاز شروع می شود.

والدین گرامی نوزاد ۳ تا ۵ روزه خود را برای انجام نمونه گیری، به خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی یا پایگاه بهداشتی ببرید.

اگر نوزاد شما مشکوک به کم کاری تیروئید است با دقت به راهنمایی های پرسنل بهداشتی گوش کنید و به توصیه های آنان عمل کنید.