



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

بیمارستان پورسینا

راهنمای تهیه نمونه ادرار از اطفال جهت کشت ادرار

جهت آزمایشات ادرار نیاز به ناشتایی نمی باشد . بهترین نمونه جهت انجام آزمایش کشت ادرار ، نمونه ادرار اول صبحگاهی می باشد که **حداقل 8 ساعت** در مثانه مانده و تغلیظ شده است در غیر این صورت می توان از نمونه ادرار رانندوم یا تصادفی جهت بررسی و کشت ادرار استفاده نمود .

در مواردی که باید آزمایش کشت ادرار انجام شود ، حداقل از 3 روز قبل بیمار نباید آنتی بیوتیک مصرف نموده باشد . محل خروج ادرار را با آب و صابون شسته سپس کاملاً با آب معمولی شستشو دهید . کیسه ادراری متناسب با جنس کودک از داروخانه تهیه نموده ، سپس بر حسب آنرا باز کرده و بطور پاکیزه روی محل قرار دهید .

هر کیسه ادراری حداکثر 45 دقیقه می تواند به محل خروجی ادرار متصل باشد . چنانچه کودک را حمام برده و سپس این کار را انجام دهید بهتر است . در هنگام خواب راحت تر می توان به کودک وصل نمود . بعد از اینکه حدود 10 الی 15 سی سی ادرار در کیسه جمع شد ، سر آنرا تا کرده تا بسته شود سپس در ظرف مخصوصی که از آزمایشگاه تهیه نموده اید قرار داده و به آزمایشگاه ارسال نمایید و تا آن زمان در جای خنک نگهداری نمایید .

واحد آموزش به بیمار

(آزمایشگاه بیمارستان پورسینا)