


هپاتیت ب (B)

هپاتیت ب به معنای التهاب کبد است .

کبد بزرگترین غده و پالایشگاه بدن است ، که در بسیاری از فعالیتهای حیاتی بدن مانند : هضم غذا ، مقابله با عفونها ، متوقف کردن خونریزی ، پاک کردن خون از سموم و داروها و ذخیره سازی انرژی در بدن نقش دارد .

هپاتیت ب : عفونت بافت کبد با ویروس نوع ب هپاتیت است و یک بیماری واگیر دار است .



راه انتقال بیماری :

- تماس جنسی با فرد آلوده
- تزریق خون و فرآورده های خونی آلوده
- از مادر به نوزاد در حین زایمان و یا مدتی بعد از آن
- استفاده مشترک از ابزار تیز آلوده (لوازم پزشکی، خالکوبی، تتو، حجامت، طب سوزنی، سوراخ کردن گوش، سرنگ آلوده ، لوازم اصلاح، تیغ و مسواک)

از چه راههایی منتقل نمی شود :

- ۱-تماسهای عادی روز مره (دست دادن ، عطسه ، سرفه ، بوسیدن، بغل کردن)
- ۲-همکاری و همکلاسی بودن
- ۳-شیر دادن در صورتی که سینه مادر زخم و خراش نداشته باشد .

افراد در معرض خطر :

- ۱-کلیه پرسنل شاغل در مراکز درمانی بستری و سرپائی که با خون و ترشحات آغشته به خون در تماس هستند (پزشکان ، پرستاران، ماماها، کارکنان آزمایشگاه، پرسنل خدماتی مراکز درمانی)
- ۲-افراد تحت دیالیز

۳-افراد هموفیلی و تالاسمی که فرآورده های خونی دریافت می کنند.

۴-افراد بی بند و بار و هم جنس گرا یا دیگر جنس گرا

۵-معنادران تزریقی

۶-کودکان مقیم شیر خوارگاه و مهد کودک ها در مناطق خیلی آلوده


علامیم و نشانه ها :

دوره کمون (دوره ای که ویروس در بدن هست ولی علامتی هنوز ایجاد نکرده) در هپاتیت ب ۳۰ تا ۱۸۰ روز است .

علامیم هپاتیت :

- تهوع و استفراغ و اسهال
- بی اشتهاپی
- درد شکم
- زردی
- ضعف و خستگی طولانی
- تیره شدن رنگ ادرار و کم شدن رنگ مدفوع
- نارسایی کبد
- درگیری کلیه و مفاصل
- سیروز (تنبلی کبد)

Hepatitis B Virus



Symptoms & Treatment

درمان :

۱-در مرحله حاد نیاز به درمان ندارد. فقط استراحت و محدود کردن فعالیت تازمانی که علامیم حاد بیماری برطرف شود .

۲-در مرحله مزمن ، مصرف دارو طبق نظر پزشک

پیشگیری :

۱-تزریق واکسن (کلیه نوزادان در بدو تولد ، افراد در معرض خطر مثل کادر درمانی ، افراد تحت دیالیز ، مصرف کنندگان مکرر خون ، افراد خانواده فرد آلوده در یک منزل) : این واکسن در سه مرحله تزریق می شود : نوبت اول ، نوبت دوم که یک ماه بعد از تزریق اول است و نوبت سوم که ۶ ماه بعد از تزریق اول است . در دوران بارداری و شیر دهی نیز می توان تزریق نمود و ۵ تا ۱۰ سال ایمنی ایجاد می کند .

۲-کنترل خون و فرآورده های خونی

۳-استفاده از وسایل یک بار مصرف و یا ضد عفونی کردن آنها

۴-استفاده از کاندوم و پرهیز از روابط جنسی متعدد

۵-استفاده از دستکش و پیشبند و عینک محافظ و سایر وسایل محافظت فردی هنگام مواجه با خون و ترشحات فرد آلوده

۶-افرادی که مواجه شده ولی واکسن دریافت نکرده اند یا تیتراژ (اندازه مناسب دفاع بدن در برابر ویروس هپاتیت ب) آنها به حداکثر نرسیده ، حداکثر ۷۲ ساعت فرصت برای تزریق ایمونوگلوبین دارند

۷-نوزادان متولد شده از مادران آلوده باید در طی ۱۲ ساعت بعد از تولد ایمونوگلوبین دریافت نمایند .

۸-به علت مقاومت بالای این ویروس که مدت ۷ تا ۱۰ روز بر روی سطوح باقی می ماند و باعث انتقال آلودگی می شود ، لذا وسایل مشترک مثل قیچی می تواند عامل انتقال باشد .

۹-لباسها و وسایل آلوده به خون آلوده به ویروس را می توان بعد از تمیز کردن خون از آنها ، با جوشاندن در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه یا به مدت نیم ساعت در وایتکس قرار داد تا عامل بیماری از بین برود .



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
بیمارستان پورسینا شهرستان مانه و سملقان

راهنمای خود مراقبتی در هپاتیت B



واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی

با آرزوی سلامتی

آدرس وب سایت بیمارستان :
nkums.ac.ir/category/15413

۹-پوستتان را مرطوب نگه دارید و لباس تنگ نپوشید .

مراقبتها :

۱-ناقلین سالم هر ۶ ماه جهت معاینه و آزمایش به پزشک مراجعه کنند .

۲- زنان باردار آلوده به ویروس جهت کاهش احتمال انتقال ویروس به نوزادشان با مراجعه به پزشک و دریافت ایمونوگلوبین نسبت به ایمن سازی نوزاد خود اقدام نمایند .



۳- افراد آلوده نباید خون ، عضو و بافت اهدا کنند .

۴- این افراد با مشاوره درمانی به افزایش کیفیت زندگی و کنار آمدن با مشکلات طبی ، اجتماعی ، روانی ، افسردگی درد و مشکلات تغذیه ای خود اقدام نمایند .

۵- شستشوی تمام قالب ها و پروتزها و وسایل ارتودنسی با مواد ضد عفونی کننده به مدت ۲۰ دقیقه با هیپو کلرید سدیم ۵ درصد ضد عفونی کردن گیره ها و فیلمهای رادیولوژی اجتناب از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات در محلی که احتمال تماس با خون و بزاق ، بافت و سایر مواد بالقوه آلوده کننده وجود دارد .

۶- از دستگاه فشار خون و تورنیکت مشترک استفاده نشود.

۷- این افراد نباید در مراکز تهیه و توزیع غذا مشغول به کار شوند .

نکته : خون بالاترین میزان ویروس بیمار را دارد . نقاط آلوده به خون حتی در صورت خشک شدن به مدت یک هفته یا بیشتر احتمال انتقال را دارد .

رژیم غذایی :

*به دلیل بی اشتها ، تهوع و استفراغ تعداد وعده های زیاد و در حجم کم مصرف شود .

*رژیم غذایی پر کربوهیدرات (مواد قندی) باشد .

*رژیم غذایی کم پروتئین و با چربی متعادل میباشد .

*به دلیل اینکه دفع برخی از داروها از طریق کبد است ، قبل از مصرف هر دارو حتی گیاهی با پزشک مشورت شود .

توصیه ها :

۱-بهداشت فردی را رعایت کرده و از وسایل شخصی مجزا (مسواک و تیغ اصلاح) استفاده کنید .

۲-از ریختن و پاشیدن خون ، بزاق و دیگر مایعات بدن در محیط جلوگیری کرده و در صورت وقوع آن محل را با محلول هیپو کلرید ۱۰ درصد یا آب ژاول ضد عفونی کنید .

۳- از تماس مستقیم خون ، بزاق و دیگر مایعات آلوده بدن با فردی که زخم باز در پوست دارد و یا مخاط افراد (چشم یا تماس جنسی) جلوگیری نمایید.

۴- کلیه افراد خانواده را با مراجعه به مراکز بهداشت واکسینه کنید
۵-از تماس جنسی حفاظت نشده با همسر خود تا زمان کامل شدن سه نوبت واکسن در آنها و افزایش تیتراژ آنتی بادی جلوگیری کرده یا از کاندوم استفاده کنید.

۶-در صورت مراجعه به دندانپزشکی و آزمایشگاه و یا هر عمل جراحی حتما بیماری خود را اطلاع دهید .

۷- در صورت خارش بدن خود حتما با پزشک خود مشورت کنید تا داروی مناسب به شما بدهد .

۸-در صورت خارش با استفاده از کیف آب سرد، مالیدن آب لیمو روی محل خارش ، میزان آن را کاهش دهید، پوست خود را نخاراندید تا زخم نشود .